

# NORGES LAND OG FOLK

TOPOGRAFISK-STATISTISK BESKREVET

VII

## JARLSBERG OG LARVIK AMT



KRISTIANIA  
FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)  
1914

TOPOGRAFISK-STATISTISK

BESKRIVELSE

OVER

## JARLSBERG OG LARVIK AMT

FØRSTE DEL  
DEN ALMINDELIGE DEL

EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING

UDGIVET VED  
AMUND HELLAND



KRISTIANIA  
FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)  
1914

Brasen forekommer i Drammenselven, der er en grændseelv for amtet, ligesaa i Fiskumvatn og da vel og i Eikeren; den forekommer i Gogsjø, Borrevatn, Aasrumvatn, Hillestadvatn, Nordre Bergsvatn og Grønnesvatn.

Der er nogle ferskvandsfiske af dem, som er indvandrede fra øst, som forekommer i Drammenselvns nedre del, der i Skoger er grændseelv for amtet.

Hid hører:

*Løya (alburnus lucidus)* er en liden ferskvandsfisk, omkring 18 cm. lang, som mest holder til i elve, gjerne samlet i stimer.

Den er ganske værdiløs som føde, men anvendes som agn. Skjællene finder nogen anvendelse ved forfærdigelse af kunstige perler.

Fremdeles er kendt fra Drammenselvns nedre del:

*Raufjodrving, ide (leuciscus idus)* holder sig mest i større indsjøer og vasdrag. Det er en noksaa stor, kraftig fisk, 40—50 cm. og mere, og en ganske god madfisk.

*Krøkle, slom (osmerus eperlanus)* er som laksen en vandrefisk, der gyder i ferskt eller brak vand, men som voksen ogsaa findes i sjøen; den gaar gjerne i stimer.

Den forekommer hos os alene i sjøer og elve paa Østlandet, men og i Drammensfjordens øvre del. Den findes enkeltvis om høsten blandt brisling udenfor Kristiania.

Fisken har en eiendommelig smag, men ansees i enkelte lande som velsmagende. Den tjener som føde for laks og ørret og lever selv af alleslags smaadyr og yngel. Den er 20—30 cm. lang.

*Sik (coregonus lavaretus)* er en noksaa stor fisk, 30—90 cm., der forekommer paa Østlandet og er indflyttet i flere sjøer, hvor den tidligere ikke fandtes.

Siken har et hvidt, nogenlunde godt kjød og er en madnyttig fisk. Den forekommer i Farrisvatn og Eikeren.

*Orekyte (phoxinus aphyia)* bliver hoist 10 cm. lang, lever af insekter og andre smaadyr samt rogn. Den er almindelig i bække og elve i det sydlige Norge. Den tjener som agn, men spises ikke; den gjør nærmest skade ved at fortære ørret- og lakserogn.

*Karuds (carassius vulgaris)* er en seigliwet ferskvandsfisk og holder sig gjerne paa mudderbund; den ligger i dvale om vinteren.

Karudsen er let at holde, men er ikke nogen anseet madfisk. I amtet forekommer den saaledes i Kullerødvatn i Andebu.

*Hersling, guldbust (leuciscus grislagine)* holder sig mest i elve, men delvis ogsaa i brakvand.

; som madfisk. Den forekommer i Grønnesvatn, Akersvatn og Grorudvatn.

*Mort (leuciscus rutilus)* forekommer i elve og indsjøer, hos os kun paa Østlandet. Den er ikke anseet som nogen god madfisk, men anvendes som agn. Den holder sig i stimer. Den er iagttaget i Strømmen herred ved Svelvik. Den forekommer i Borrevatn, Vestmoenvatn, Hallevatn og Torpevatn.

*Sørv (leuciscus erythrophthalmus)* holder sig gjerne paa mudderbund. Den er en lidet værdifuld ferskvandsfisk, 30—35 cm. lang. Den er kendt fra omegnen af Larvik. Den kaldes i Jarlsberg og Larvik amt suril og forekommer i Farrisvatn og Eikeren.

*Nianging, ferskvandslampretten (petromyzon planeri)* er sjelden over 25—30 cm. lang. Den er almindelig i elve i det sydlige Norge.

*Perleskjæl.* I en indberetning af 1648 nævnes 3 elve som særlig rige paa perler. Den ene af disse var **Aarholtselven i Tønsberg len** (d. e. den elv, som fra Andebu gennem Askimvatn gaar ind i Skjee og siden paa grænsen mellem Sandeherred og Kodal ud i Gogsjø).

Det heder, at folk troede, at perlerne kun var modne Sankthansnatten.

Perlefiske var i ældre tider et regale for dronningen, senere for statskassen. Perlerne findes i perlemuslingen eller perleskjællet (*unio margaritifera*). Der blev indsat «inspektorer» til at have overopsyn, og de, som antoges som fiskere, slap militærtjeneste.

Nettoindtægterne blev smaa. Det heder, at bønderne fiskede i al hemmelighed perler og solgte dem til hollænderkipperne. Flere af de indsatte inspektorer blev mistænkt for uærlighed. Der blev drevet en ødelæggende rovfangst, perleskjæl blev opfisket i tøndevís. Allerede tidlig i 17de aarh. var elven udfisket. I 1734 blev sendt op en saksisk perlefisker, som paa-stod at kunne aapne og undersøge muslingerne uden at skade dem.

Som et findested for perler nævnes **Hallevatns vasdrag i Brunlanes**.

Om perlefisket, se Nedenes amt, bind I, pag. 337.

Af og til findes kostbare perler i norske elve. I **Granelven i Snaasen** fandtes saaledes en perle 13 mm. i diameter, vægtig 2.2 gram, hvilken i Kristiania betaltes med 3000 kr.

**Udbyttet af ferskvandsfisket** i amtet, naar laksen ikke regnes med, er ikke betydeligt. Arealet af indsjøer i Jarlsberg og Larvik amt udgjør 75 km.<sup>2</sup> Antages, som almindelig i Norge, et gennemsnitligt udbytte af 30 kg. fisk pr. km.<sup>2</sup> om aaret, skulde